Manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

JULIA DÍEZ MARTÍN

R1 APARATO DIGESTIVO

05/02/2024 – COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

- El **reflujo gastroesofágico** (RGE) es una condición fisiológica que consiste en el paso del contenido gástrico hacia el esófago.
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico (**ERGE**) → Síntomas consecuencia del RGE

Epidemiologia

Review > Gut. 2018 Mar;67(3):430-440. doi: 10.1136/gutjnl-2016-313589. Epub 2017 Feb 23.

Global prevalence of, and risk factors for, gastro-oesophageal reflux symptoms: a meta-analysis

Leonardo H Eusebi ^{1 2}, Raguprakash Ratnakumaran ^{3 4}, Yuhong Yuan ⁵, Masoud Solaymani-Dodaran ^{6 7}, Franco Bazzoli ¹, Alexander C Ford ^{3 4}

Symptoms of gastro-oesophageal reflux: prevalence, severity, duration and associated factors in a Spanish population

M Diaz-Rubio ¹, C Moreno-Elola-Olaso, E Rey, G R Locke 3rd, F Rodriguez-Artalejo

ERGE → Pirosis/regurgitación al menos 1 vez/semana

Prevalencia mundial: 13.3% (IC 95% 12-14.6%)

Prevalencia Europa: 17.1% (IC 95% 15.1-19.1%)

Prevalencia España: 9.8% (IC 95% 8.6-10.9%)

Clínica

Típicos

Pirosis
Regurgitación

Atípicos

Dolor torácico de origen no cardíaco
Tos, laringitis, asma, erosión dental → **ASOCIACIÓN ESTABLECIDA**
Faringitis, sinusitis, FPI, otitis media recurrente → **ASOCIACIÓN PROPUESTA**

Factores favorecedores

- Obesidad (IMC > 30) o sobrepeso (IMC 25-30)
- Tabaco
- Fármacos
- Hernia de hiato
- Ejercicio físico
- Alto nivel de estrés

Tabla 1 FÁRMACOS QUE FAVORECEN EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Reducción de la presión del EEI

- AINE	- Benzodiacepinas (diazepam)
- Agonistas betaadrenérgicos	- Estrógenos
- Antagonistas alfaadrenérgicos	- Progesterona
- Anticolinérgicos	- Teofilina
- Bloqueadores de los canales del calcio/nitritos	- Antidepresivos tricíclicos

Daño de la mucosa esofágica

- AAS y AINE	- Cloruro potásico
- Bifosfonatos	- Quinidina
- Sales de hierro	- Tetraciclina/doxiciclina, clindamicina
- Ácido ascórbico	- Quimioterápicos

Alteración del vaciamiento gástrico

- AINE	- Bloqueadores de los canales del calcio
--------	--

AAS: ácido acetil salicílico; AINE: antiinflamatorio no esteroideo; EEI: esfínter esofágico inferior.

Fuente: elaboración propia.

¿Factores favorecedores?

- Dieta: Café, chocolate, grasas, picantes...
- Alcohol
- Erradicación del H. pylori.
- Genética

Diagnóstico

➤ Anamnesis

- Presencia de síntomas típicos → Frecuencia, gravedad, duración, desencadenantes...

- Síntomas de alarma →

Disfagia	Vómitos recidivantes
Perdida de peso	HDA
Anemia ferropénica	Masa epigástrica

➤ Cuestionario GRDQ/RQD

Diagnóstico

IBP dosis estándar 4-8 semanas
IBP dosis doble 1-2 semanas

- ❖ Síntomas típicos sin datos de alarma → Tratamiento empírico con IBPs
- ❖ Síntomas atípicos → Valorar pruebas complementarias.

↓
Excluir otras causas

- Respuesta clínica favorable → **DIAGNÓSTICO**
- Respuesta clínica parcial/nula →
 - IBP dosis doble x4 semanas
 - Cambiar de IBP

Diagnostico: Endoscopia

INDICACIONES

- Síntomas de alarma
- ERGE refractaria a IBPs
- ERGE recidivante
- Previo a cirugía antirreflujo

- Alto riesgo de esófago de Barret → ERGE > 5 años +3

Sexo masculino	Obesidad
50 años	Historia familiar de Barret o Ca. esofágico
Raza blanca	
Tabaquismo	

Diagnostico: Endoscopia

- Permite visualizar lesiones mucosas ocasionadas por la ERGE

→ ERGE no erosiva (60-70%)

→ ERGE erosiva

Esofagitis erosiva (30%)

Esófago de Barret (5-12%)

Diagnóstico: pHmetría

La pHmetría es la técnica de elección para evaluar el reflujo gastroesofágico patológico

INDICACIONES

- Pacientes refractarios al tratamiento con IBP
 - Previa a la realización del tratamiento quirúrgico
 - Pacientes con síntomas extraesofágicos.
-
- Con IBP: Si ERGE demostrada por endoscopia
 - Sin IBP: Si endoscopia previa normal o esofagitis leve.

Tratamiento

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evitar alimentos desencadenantes, individualizando
- Evitar fármacos que aumentan el reflujo
- Abandono del habito tabáquico
- Perdida de peso en pacientes con sobrepeso/obesidad
- Medidas posturales: Elevación del cabecero de la cama, espaciar decúbito-ingesta, decúbito lateral izquierdo.

Tratamiento: IBPs

- Tratamiento de elección en la ERGE.
- Tras prueba 4-8 semanas, intentar suspender o dosis mínima eficaz
- Si fracaso terapéutico con dosis convencionales → doblar la dosis

Omeprazol 10-20-40 mg (*Parizac*[®], *Pepticum*[®], *Nuclosina*[®]).

Pantoprazol 20-40 mg (*Anagastra*[®], *Pantecta*[®]).

Esomeprazol 10-20-40 mg (*Nexium*[®], *Vimovo*[®]). Ligeramente superior en la esofagitis grave.

Lansoprazol 15-30 mg (Si disfagia/odinofagia: *Opiren*[®] o *Monolium Flas*[®] bucodispersable).

Rabeprazol 10-20 mg (*Pariet*[®]).

Efectos adversos de los IBP

❖ Infecciones entéricas

Randomized Controlled Trial > *Gastroenterology*. 2019 Sep;157(3):682-691.e2.

doi: 10.1053/j.gastro.2019.05.056. Epub 2019 May 29.

Safety of Proton Pump Inhibitors Based on a Large, Multi-Year, Randomized Trial of Patients Receiving Rivaroxaban or Aspirin

- ❖ Disminución de la absorción de micronutrientes.
- ❖ Otras: Demencia, enfermedad renal

Tratamiento: Otros fármacos

ANTIÁCIDOS/ALGINATOS

- Alivio puntual de síntomas leves +/- IBP

SUCRALFALATO

- Alivio puntual de síntomas leves +/- IBP

ANTI-H2

- Alivio puntual de síntomas moderados
- + IBP para ERGE refractarias
- + pauta descendente de IBP

BACLOFENO

- ERGE refractaria a IBP → Reflujo no ácido

PROCINÉTICOS

- +IBP si enlentecimiento del vaciado gástrico

Tratamiento: Cirugía

INDICACIONES

- Mal control del reflujo ácido
- Hernia hiatal de gran tamaño
- Complicaciones incontrolables.
- Situaciones en las que no sea posible el tratamiento médico (alergias o efectos secundarios)

Conclusiones

- La ERGE engloba tanto síntomas y lesiones mucosas esofágicas como síndromes extraesofágicos.
- La estrategia diagnóstica más utilizada es la respuesta sintomática a un tratamiento empírico con IBP.
- No en todos los pacientes con sospecha de ERGE está indicada la realización de una endoscopia diagnóstica.
- El tratamiento de elección son los IBP, que en caso de requerir terapia de mantenimiento deben administrarse a la dosis más baja eficaz.

Bibliografía

Asociación Española de Gastroenterología. Guía de práctica clínica sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el adulto. 2019.

Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, Greer KB, Yadlapati R, Spechler SJ. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. *Am J Gastroenterol*. 2022 Jan 1;117(1):27-56. doi: 10.14309/ajg.0000000000001538. PMID: 34807007; PMCID: PMC8754510.

Fass, R. (2022). Gastroesophageal Reflux Disease. *New England Journal of Medicine*, 387(13), 1207-1216. <https://doi.org/10.1056/nejmcp2114026>

Antunes C, Aleem A, Curtis SA. Gastroesophageal Reflux Disease. 2023 Jul 3. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan—. PMID: 28722967.

MUCHAS
GRACIAS